

อาการที่ต้องมาพบแพทย์ทันที

1. ผิวหนังบริเวณตั้งแต่สายสวนถึงคอ มีอาการปวด บวม แดง ร้อน ร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น
2. เลือดไหลซึมออกจากแผลมากผิดปกติ (ไหลออกมาจากพลาสติกที่ปิดแผล)

3. แขนหรือหน้า ข้างที่ใส่สายสวน หลอดเลือดดำมี อาการบวม หรือ ใหญ่กว่าอีกข้าง



4. สายเลื่อนออกมา ห้ามเลื่อนสายออกหรือเข้าไป หลอดเลือด ให้นำพลาสติกตรงสายไม่ให้เลื่อน หลุด และรีบมาพบแพทย์ทันที

- ปฏิบัติตัวได้ดี
- เล่นใช้ได้นาน
- ฟอกเลือดได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
หน่วยไตและไตเทียม
อาคารกัลยาณิวัฒนาอนุสรณ์ ชั้น 4
เบอร์ภายใน 67208-9




สแกน QR code
เพื่อเข้าถึงเอกสาร

ที่มา : Hemodialysis renal
replacement therapy



ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
หลังใส่สายสวนหลอดเลือดดำเพื่อ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม



จัดทำโดย
นางสุพรรณิ มหาสิทธิ์
ที่ปรึกษา
นางผ่องใส เวียงนันทน์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ
นางพูนศรี กุลโรส พยาบาลชำนาญการ

หน่วยไตและไตเทียม
แผนกการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น