

2.ธาตุเหล็ก

2.1 ธาตุเหล็ก ให้ทางเส้นเลือด (ยาแช่เย็นเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศา)



2.2 ธาตุเหล็ก (รับประทาน)



ผลข้างเคียง - อาจคลื่นไส้ ท้องเสีย หรือ ท้องผูก
ข้อควรระวัง - ทำให้มีอุจจาระเป็นสีดำหรือคล้ำขึ้น

ยาวิตามิน



ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีโอกาสขาดวิตามินได้จากอาหารที่ทาน คลื่นไส้ อาเจียน หรือจากกระบวนการฟอกเลือด

ข้อควรปฏิบัติการได้รับยา

- 1.ผู้ป่วยควรรู้ชื่อยา ขนาดยา วัตถุประสงค์ของยาที่ใช้
- 2.ผู้ป่วยควรจำ ชื่อยา หรือบันทึกชื่อยาพร้อมความผิดปกติ กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และแจ้งให้แพทย์ พยาบาลประจำห้องไตเทียมทราบ
- 3.หากผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานยาในขนาดยาที่แนะนำได้ เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม ควรแจ้งให้แพทย์พยาบาลทราบ เพื่อป้องกันการสับสนในการได้รับยาและผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา
- 4.ผู้ป่วยไม่ควรใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอง โดยที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เนื่องจากอาจได้รับผลเสียจากการสะสมของสารต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและ เกิดปฏิกิริยากับยาที่ผู้ป่วยได้รับ
- 5.หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับยาที่ใช้สามารถสอบถาม ขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากแพทย์/พยาบาลประจำห้องไตเทียมที่ท่านรับการรักษา



ยาที่ใช้บ่อย ในผู้ป่วยฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม



หน่วยไตและไตเทียม
แผนกการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น