

ผู้ป่วยไตเรื้อรังจำเป็นต้องได้รับยาหลายชนิด
เนื่องจาก

- 1.รักษาโรคร่วม ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
- 2.รักษา/แก้ไขภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ได้แก่ ภาวะโพแทสเซียมสูง ภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูง ภาวะเลือดเป็นกรด

ยาลดความดันโลหิตและตัวอย่างยา

- 1.รับประทานยา ตรงเวลา ไม่รอมืออาหาร
- 2.ถ้าลืมรับประทานยาควรรับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้ถึงเวลาของยามื้อต่อไปให้งดมื้อที่ลืมและรับประทานมื้อปกติ
- ห้ามรับประทานเพิ่มเป็น 2 เท่าเด็ดขาด
- 3.ผู้ป่วยบางราย แพทย์จะแจ้งงดยาความดันบางตัว ก่อนการฟอกเลือดโดยพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นรายบุคคล



กลุ่มยารักษาภาวะเลือดเป็นกรด

ขนาดของยาที่ใช้ขึ้นกับ ระดับความเป็นกรดต่าง
ในเลือดและการตอบสนองต่อยาในผู้ป่วยแต่ละราย
ไม่ใช่ยาแก้ท้องอืดหรือรักษาโรคกระเพาะอาหาร
ยาที่ใช้รักษาคือ **Sodamint**

ผลข้างเคียง - ท้องอืด



ตัวอย่างยาจับฟอสเฟต



รับประทาน
พร้อมอาหาร
จำเป็นต้องเคี้ยว



รับประทาน
พร้อมอาหาร
ไม่จำเป็นต้องเคี้ยว



รับประทาน
พร้อมอาหาร
จำเป็นต้องเคี้ยว

กลุ่มยาแก้ไขภาวะซีด

- 1.ชนิดฉีดได้แก่ **Erythropoietin** (ยาแซ่เย็นเก็บ ที่อุณหภูมิ 2-8 องศา) ให้ทางเส้นเลือด หรือ
ชั้นใต้ผิวหนัง

ผลข้างเคียง - ความดันโลหิตสูง

